# AVERTISSEMENTS



## AGRICOLES

LORRAINE

Bulletin n° 12 du 23 mai 1995

Blé: traitement

épiaison.

#### **GRANDES CULTURES**

#### Blé

Ils arrivent à l'épiaison dans les secteurs les plus précoces.

Malgré les pluies, la septoriose a peu évolué, contrariée par les températures un peu trop froides.

#### Spécial Présept

Le risque s'élève très lentement et devrait devenir moyen, ce qui correspondra à une période idéale de traitement dans le courant de cette semaine. Les blés du plateau du Barrois et du Pays-Haut sont encore légèrement en retard et n'atteindront la phase de traitement que dans le courant de la semaine prochaine.

Dans les parcelles arrivant à l'épiaison, le traitement, que ce soit le premier ou le deuxième, devra être fait quelle que soit la région. Dans les parcelles entre le stade sortie dernière feuille et épiaison, effectuer le premier traitement dès cette semaine dans tous les secteurs autres que le plateau du Barrois et le Pays-Haut. Dans ces deux régions, on pourra le différer de quelques jours encore. Si un traitement a été fait vers le stade 2 noeuds, attendre l'épiaison pour le renouveler. Dans tous les cas, utiliser un produit très efficace sur septoriose et rouille brune (triazole seule ou avec matière active de contact). Tout mélange avec un insecticide est inutile. Il ne sera pas nécessaire de renouveler les traitements effectués après le stade sortie dernière feuille.

## Orge de printemps

Les plus avancées atteignent les stades 1-2 noeuds.

Surveiller les parcelles et intervenir entre les stades 2 noeuds et sortie de la dernière feuille, si vous constatez un développement important rhynchosporiose et d'oïdium.

Choisir une spécialité efficace contre ces deux maladies (triazole + morpholine). S'ils ont été effectués avec des produits destinés à lutter contre ces maladies, les traitements de semence peuvent retarder leur développement.

### Tournesol

Les tournesols sont au stade 3 à 4 paires de feuilles.

#### **Pucerons**

Sur les parcelles non traitées avec du Gaucho, on observe quelques pucerons ailés.

Attendre que les seuils d'intervention suivants soient atteints : De la levée à B5 (5 feuilles): 30 à 50 pucerons par plante De B5 à E1 (bouton étoilé) : 50 à 100 pucerons par plante. Pas de traitement pour le moment.

#### **Pois**

Les pois sont au stade 8 à 10 feuilles. La présence de pucerons est faible dans la plupart des parcelles.

Pas de traitement spécifique.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

350 F

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 38. rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél.: 83.30.41.51

ABONNEMENT ANNUEL

Publication périodique CPPAP Nº 2011 AD - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation - ISSN 0980 - 8507

Imprimerie de la DRAF - Directeur-gérant : D. VERBEKE